

カメムシ類

スコットカメムシ									侵入時期		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									←→		

国内には800種類以上が生息し、北海道、東北、

北陸、本州の山岳地帯に分布しています。

秋ごろから集団で飛来して家の壁一面にとまり、

室内侵入をして悪臭をはなち、住居者に強い

不快感をあたえます。その他に植物の汁を吸う

農業害虫としての面もあります。

特徴

大きさ、形態、色は多様です。いっけんすると

違う虫のように見えるものもあります。生息する場所もさまざまです。針状の口をもっています。

被害

1. 集団で飛来（越冬のため）

- 秋季：屋内に侵入
- 春季：屋外に脱出するため室内を徘徊




スコットカメムシ成虫

体長：9~11mm

高冷地での侵入が多い

(八ヶ岳、富士山麓など)

2. 夏季の夜間室内に侵入（灯りに誘われて）



日常生活での被害

- 寝具の間に潜り込む
- 洗濯物にシミがつく
- 電灯に飛来する
- 浴槽に落下する
- 乳幼児に皮膚炎を起こす
など



マルカメムシ成虫

体長：約5mm

左（背側）右（腹側）

新興住宅地などで被害
（甲府盆地周辺など）

生態

越冬場所から移動



飛来侵入

- 侵入しんにゆうが起こる家おと起こらない家いえが隣接おすることもあります
- 飛来侵入は、小春日和こはるびよりで、気温きおんが20°Cをこえると一斉いっせいに起こります

■ カメムシたいに対する誤解ごかい

- 秋あきに家の近くいえで異常発生ちかく いじょうはっせいしたものが、冬ふゆの間に家あいだの中で子いえを産み

そだ
育つ

- 今年ことし出ていった虫でが、来年むし仲間らいねんなかまをたくさん連れてつやってくる
- 毎年まいとし、同じ虫おながかよってくる
- 一年中いちねんじゅう家にいえに住みすついている
- 食べ物たべものや建物たてものを食たべてしまう

予防・対策

カメムシ類るいは野外やがいで発生はっせいし、飛来ひらいするため、発生源はっせいげんを特定とくていすることは困難こんなんです。

このため、侵入しんにゆうする個体数こたいすうを少なくすくすることをまず目標もくひょうとして対策たいさくをたてることとなります。

- 隙間すきまをなくす（カメムシは2~3cmの隙間すきまがあれば侵入しんにゆうが可能です）
- 網戸あみどの設置せっち
- カメムシ用忌避剤ようきひざいの使用しよう（外壁がいへき、隙間すきま、換気扇かんきせん、窓際まどぎわなど）

★ ^{しつない} ^{しんにゆう} 室内に侵入させないようにしましょう

★ ^{しんにゆう} ^{こたいすう} ^{すくなく} 侵入する個体数を少なくしましょう

➡ ^{しつない} ^{しんにゆう} ^{ばあい} 室内に侵入した場合

★ ^す ^で ^{つか} 素手では捕まえないように注意しましょう ★

^{あくしゆう} ^{からだ} ^{ふちやくぼうし} ^{えんしょうぼうし}
(悪臭の体への付着防止, 炎症防止など)

- ^{すばや} ^と 素早く捕らえて, ^だ つまみ出しましょう (^{はし} ^{つか} 箸などで掴みましょう)
- エアゾール ^{さっちゆうざい} ^{しょう} 殺虫剤を使用しましょう
- ^{らっか} 落下したカメムシ類は「死んだふり」をすることもあります。 ^{ほうき} 箒, ^{そうじき} ^{あつ} ^と ^{のぞ} 掃除機などで集めて取り除きし, ^{はや} ^す 早く捨てましょう
- ^{かず} ^{おお} ^{ばあい} ^{くんえんざい} ^{しょう} 数が多い場合は燻煙剤を使用しましょう。

【^{ちゆうい} 注意】 ^{けいさっちゆうざい} ^{こうか} ピレスロイド系殺虫剤は効果がありますが, ^{しぼう} ^{じかん} 死亡するまでに時間が

かかることもあります。このため ^{くじよ} ^{ぶつりてきくじよ} ^{つぶ} 駆除するには物理的駆除(潰すなど)

^{もっと} ^{かくじつ} が最も確実です


■ はっせいげん 発生源になりやすい しょくぶつ 植物

だいひょうてき 代表的な しゅるい 種類について かきしめ 下記に示しました。

種 類	植 物
ツチカメムシ	ムクゲなどの根, クスノキなどの果実
マルカメムシ	マメ科
クサギカメムシ	果実のなる木
スコットカメムシ	ヤマハンノキ, ミズナラなど

㊦ 夏季に集団で灯火に飛来する種類

- ミナミマルツチカメムシ (体長: 約 6mm)
- チャバネアオカメムシ (体長: 約 10~12mm)



被害

か おく 家屋に しんにゆう 侵入し, あくしゆう 悪臭, あんみん 安眠の さまた 妨げ, みみ 耳の中に しんにゆう 侵入 (しゅうしんちゆう 就寝中)

などをおこすことがあります。

<参考図書>

1. 松崎沙和子 武衛和雄 著 : 都市害虫百科 朝倉書店 (1993)
2. 梅谷顕二著 : 野外の毒虫と不快な害虫 全国農村教育協会 (1994)
3. 服部畦作 森谷清樹 著 : 不快害虫とその駆除 (財) 日本環境衛生センター (1987)

<写真>

1. 山梨県福祉保健部衛生薬務課 山梨県衛生公害研究所 : 日常生活と周辺の虫たち (2001)